

Traitement contre les verrues Dr. Scholl's® Clear Away® avec technologie DURAGEL MC

Les informations relatives à l'étiquetage des médicaments sur ce site Web peuvent différer de l'étiquetage du produit acheté. Veuillez consulter l'emballage pour obtenir des informations concernant ce produit. Fiche de medicament.

Fiche de médicament

Ingrédient actif Utilisation

Purpose

Acide salicylique à 40 %Éliminateur de verrues

Indications • pour l'élimination des verrues communes. La verrue commune est facilement reconnaissable à l'aspect rugueux de sa surface qui ressemble à un chou-fleur

Avertissements

Pour usage externe seulement

N'utilisez pas

- si vous êtes diabétique
- si vous avez une mauvaise circulation sanguine
- sur la peau irritée ou sur toute zone infectée ou rougeur de peau
- sur les grains de beauté, les taches de naissance, les verrues avec poils, les verrues génitales, ou les verrues du visage

Cessez le traitement et consultez un médecin si l'inconfort persiste

Tenez hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, demandez l'avis d'un médecin ou appelez immédiatement un centre antipoison.

Mode d'emploi

- lavez la zone affectée
- vous pouvez faire tremper la verrue dans de l'eau chaude pendant 5 minutes
- séchez bien la partie affectée
- si nécessaire, coupez le disque médicamenteux à la taille de la verrue
- appliquez la face collante du disgue médicamenteux à la peau
- recouvrez le disque à l'aide de la bandelette protectrice fournie
- répétez la procédure toutes les 48 heures si nécessaire (jusqu'à ce que la verrue soit enlevée) pendant une période maximale de 12 semaines

Autres renseignements

- Conservez entre 20° et 25 °C (68 ° à 77 °F)
- Protégez de la chaleur excessive (températures supérieures à 40 °C (104 °F)

Ingrédients inactifs antioxydant (CAS 991-84-4), oxydes de fer, huile minérale, résine d'hydrocarbure de pétrole, dioxyde de silicium, caoutchouc polyisoprène synthétique, talc

Questions? 1-866-360-3226