

Enlève-callosités Dr. Scholl's® en une étape

Les informations relatives à l'étiquetage des médicaments sur ce site Web peuvent différer de l'étiquetage du produit acheté. Veuillez consulter l'emballage pour obtenir des informations concernant ce produit.

Fiche de médicament	
Ingrédient actif Utilisation Acide salicylique à 40 %.....	Purpose Enlève-callosités
Indications <ul style="list-style-type: none"> ▪ pour l'élimination des callosités ▪ soulage la douleur en éliminant les callosités 	
Avertissements Pour usage externe seulement	
N'utilisez pas le produit <ul style="list-style-type: none"> ▪ si vous êtes diabétique ▪ si vous avez une mauvaise circulation sanguine ▪ sur la peau irritée ou sur toute zone infectée ou rougeur de peau 	
Cessez le traitement et consultez un médecin si l'inconfort persiste	
Tenez hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, demandez l'avis d'un médecin ou appelez immédiatement un centre antipoison.	
Mode d'emploi <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavez la zone affectée et séchez bien ▪ si nécessaire, coupez le disque médicamenteux à la taille de la callosité ▪ appliquez la face collante du disque médicamenteux à la peau ▪ recouvrez le disque à l'aide de la bandelette protectrice fournie ▪ enlevez le disque médicamenteux après 48 heures ▪ répétez la procédure toutes les 48 heures si nécessaire (jusqu'à ce que la callosité soit enlevée) pendant une période maximale de 14 jours ▪ vous pouvez faire tremper la callosité dans de l'eau chaude pendant 5 minutes pour en faciliter l'élimination 	
Autres renseignements <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conservez entre 20° et 25 °C (68 ° à 77 °F) ▪ Protégez de la chaleur excessive (températures supérieures à 40 °C (104 °F)) 	
Ingrédients inactifs antioxydant (CAS 991-84-4), oxydes de fer, huile minérale, résine d'hydrocarbure de pétrole, dioxyde de silicium, caoutchouc polyisoprène synthétique, talc	
Questions? 1- 866-360-3226	