

Enlève-cors ultramines Dr. Scholl's®

Les informations relatives à l'étiquetage des médicaments sur ce site Web peuvent différer de l'étiquetage du produit acheté. Veuillez consulter l'emballage pour obtenir des informations concernant ce produit.

Fiche de médicament	
Ingrédient actif Utilisation Acide salicylique à 40 %.....	Purpose Enlève-cors
Indications <ul style="list-style-type: none"> ▪ pour l'élimination des cors ▪ soulage la douleur en éliminant les cors 	
Avertissements Pour usage externe seulement	
N'utilisez pas <ul style="list-style-type: none"> ▪ si vous êtes diabétique ▪ si vous avez une mauvaise circulation sanguine ▪ sur la peau irritée ou sur toute zone infectée ou rougeur de peau 	
Cessez le traitement et consultez un médecin si l'inconfort persiste	
Tenez hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, demandez l'avis d'un médecin ou appelez immédiatement un centre antipoison.	
Mode d'emploi <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavez la zone affectée et séchez-la bien ▪ si nécessaire, coupez le disque médicamenteux à la taille du cor ▪ appliquez la face collante du disque médicamenteux à la peau ▪ recouvrez le disque à l'aide de la bandelette protectrice fournie ▪ enlevez le disque médicamenteux après 48 heures ▪ répétez la procédure toutes les 48 heures si nécessaire (jusqu'à ce que le cor soit enlevé) pendant une période maximale de 14 jours ▪ vous pouvez faire tremper le cor dans de l'eau chaude pendant 5 minutes pour en faciliter l'élimination 	
Autres renseignements <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conservez entre 20° et 25 °C (68 ° à 77 °F) ▪ Protégez de la chaleur excessive (températures supérieures à 40 °C (104 °F)) 	
Ingrédients inactifs antioxydant (CAS 991-84-4), oxydes de fer, huile minérale, résine d'hydrocarbure de pétrole, dioxyde de silicium, caoutchouc polyisoprène synthétique, talc	
Questions? 1- 866-360-3226	